



1. Effectuer un lavage hygiénique des mains au savon.
2. Désinfecter soigneusement le méat urinaire à l'aide de compresses stériles imbibées d'antiseptique, en prenant soin de bien nettoyer la vulve chez la fille, le prépuce et le gland chez le garçon

3.1 Première possibilité : recueil "à la volée" ou "milieu de jet" :

C'est la technique à privilégier : en réduisant la contamination des urines par la flore périnéale, elle assure une meilleure fiabilité des résultats. Cette technique est utilisable chez les nourrissons, qui urinent en général toutes les 20 à 30 minutes.

- Allonger l'enfant, sans couche, ou couche ouverte et se tenir prêt à recueillir les urines du milieu du jet, au moment où l'enfant urine.
- Utiliser un flacon stérile à coproculture, plus grand, qui facilitera le recueil.

3.2 Deuxième possibilité : recueil d'urines à l'aide d'un collecteur (poche) :

- Laisser sécher avant de poser la poche.
- Suivre les indications fournies avec la poche : Détacher et jeter la découpe centrale de la poche, retirer le revêtement qui protège l'adhésif sans toucher l'intérieur de la poche qui est stérile.
- Appliquer la poche en massant pour garantir une bonne adhérence.



Ne pas dépasser 1 heure de pose du sac collecteur.
Passé ce délai, recommencer l'opération avec une nouvelle poche

Si la poche est souillée par les selles du bébé, recommencer l'opération.

- Dès la miction terminée, retirer la poche. **NE PAS TRANSVASER**
- Pour assurer l'étanchéité, coller l'adhésif face contre face, renforcer éventuellement avec un sparadrap et déposer la poche **verticalement** dans un flacon stérile à large ouverture pour le transport.
- Identifier le pot : nom/prénom

4. Acheminer au laboratoire **RAPIDEMENT** dans un délai maximal de :

- 2h à température ambiante
- 24 heures au réfrigérateur (+4°C)



NOM : PRENOM :

Renseignements cliniques

Date et heure de recueil :

Comment avez-vous recueilli les urines ? :

- Poche (Mise en place maximum 1 heure)
- Recueil à la volée

Toilette avant recueil ? Oui Non

Pourquoi l'enfant fait-il une analyse d'urine ? :

- 1^{ère} infection urinaire ?
- Pathologie des voies urinaires :
- Présence de symptôme(s) :
 - Fièvre
 - Autres :

TRAITEMENTS ANTIBIOTIQUES OU ANTIFONGIQUES

- Aucun
- Prévu mais non commencé
- Terminé < 7 jours
- En cours

Nom du traitement :