

# IV - Tests dynamiques

## A. Tests en ville

### 1. Glycémie à jeun et post-prandiale

- Réaliser le prélèvement sur un **tube gris** lorsque le patient est à jeun.
- Réaliser un deuxième prélèvement 2 heures après le début d'un déjeuner normal ou un petit déjeuner copieux équivalent à un repas.

### 2. Test d'intolérance au glucose (ou HGPO)

#### Pour les diabètes gestationnels :

- Réaliser un premier prélèvement pour la glycémie à jeun.
- Le patient ingère 75 g de glucose.
- Prélever sur un **tube gris** après 60 et 120 minutes, la patiente étant au repos dans l'intervalle de temps pour le dosage de la glycémie après charge.

Dans les autres cas : prélever sur **tube gris** après 30, 60, 90, 120, 150 et 180 minutes.

Les urines peuvent être recueillies aux mêmes temps **sur demande explicite du médecin.**

### 3. Test au synacthène immédiat

Ce test permet l'étude de la capacité sécrétoire de la corticosurrénale.

Le patient doit être à jeun depuis 12 heures, au repos depuis 30 minutes, afin de minimiser les phénomènes de stress.

Ce test est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité à l'un des constituants du Synacthène® immédiat.

- **A 8 heures**, réaliser le prélèvement de **cortisol**.
- Injecter 0,25mg de Synacthène® immédiat.
- Réaliser un second prélèvement à **60 minutes plus tard**.

Pour les autres types de tests dynamiques (test LH-RH, test à la TRH...), contacter le laboratoire.